



Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο οδηγιών πριν από την έναρξη της αγωγής.

Πληροφορίες για τις φθείρες του τριχωτού της κεφαλής

Η φθείρα του τριχωτού της κεφαλής είναι ένα μικροσκοπικό έντομο χωρίς φτερά, το οποίο ζει αποκλειστικά στα μαλλιά και τρέφεται με αίμα. Μετακινείται χρησιμοποιώντας τα 3 ζεύγη ποδιών της που της επιτρέπουν να προσκολλάται στις τρίχες των μαλλιών. Μια ενήλικη φθείρα έχει μήκος 3-4 χιλιοστά και ζει περίπου 30 ημέρες. Η θηλυκή φθείρα μπορεί να παράγει 200 με 300 αυγά κατά τη διάρκεια της ζωής της. Αυτά εκκολοπνούνται μετά από 7 ημέρες και οι φθείρες γίνονται ενήλικες σε 10 ημέρες. Όταν τρέφονται, εγχέουν σάλιο στο δέρμα του τριχωτού της κεφαλής, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αντίδραση υπερευαισθησίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρού κνησμού και ερεθισμού. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με οχολαστικό έλεγχο του τριχωτού της κεφαλής που στοχεύει στον εντοπισμό φθειρών ή των αυγών τους, τα οποία είναι περισσότερο εμφανή.

Πως κολλάμε φθείρες;

Οι φθείρες μεταφέρονται κυρίως από το ένα κεφάλι στο άλλο, είτε ως αποτέλεσμα άμεσης επαφής, κυρίως από παιδιά στο άμεσο περιβάλλον μας, είτε μέσω επαφής με καπέλα, κασκόλ, σακάκια, χτένες, μαλακά παιχνίδια κ.λπ. Οι φθείρες δεν αποτελούν ένδειξη φτωχής υγιεινής, το αντίθετο, οι φθείρες προτιμούν καθαρά φυσικά μαλλιά.

Πληροφορίες για το Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray

Το Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray έχει αποδειχθεί* ότι είναι μια αποτελεσματική αγωγή κατά των φθειρών του τριχωτού της κεφαλής με τριπλή δράση:

- Εξουδετερώνει τις φθείρες - του τριχωτού της κεφαλής σε 5 λεπτά δια της ασφυξίας και αφυδάτωσης. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής αντιμετώπιση των φθειρών και κονιδιών, αφήστε το για 10 λεπτά. Επειδή το Extra Strong Treats & Protects Spray δεν περιέχει εντομοκτόνα, οι φθείρες του τριχωτού της κεφαλής δεν μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στα συστατικά του.
- Προστατεύει - το Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray περιέχει LPF, μια ουσία που κάνει τα μαλλιά λιγότερο ελκυστικά για τις φθείρες ενώ προστατεύει από επαναμόλυνση μέχρι και 72 ώρες*.
- Εύκολο στο χτένισμα και ξέβγαλμα - σύνθεση χωρίς σιλκόνη. Δεδομένης της περιεκτικής δράσης, η φθείρα δεν μπορεί να αναπτύξει αντοχή στα συστατικά της.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray;

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω.

Ελέγξτε για την παρουσία φθειρών

Χρησιμοποιήστε την ειδικά σχεδιασμένη κτένα απομάκρυνσης των φθειρών που εσωκλείεται, προκειμένου να ελέγξετε προσεκτικά το τριχωτό της κεφαλής κάθε μέλους της οικογένειας, κατά προτίμηση υπό το φως της ημέρας. Εφαρμόστε την αγωγή σε όλα τα μέλη της οικογένειας που έχουν προσβληθεί, την ίδια ημέρα, προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο μιας νέας μόλυνσης.

- Είναι ευκολότερο ο έλεγχος να γίνει σε στεγνά μαλλιά.
- Αρχικά ξεμπλέξτε τα μαλλιά και ακολουθώντας ελέγξτε τα τούφα, τούφα.
- Ελέγξτε τις ρίζες των τριχών, στην περιοχή πίσω από τα αυτιά και του αυχένα, καθώς οι φθείρες και τα αυγά τους εντοπίζονται συνηθέστερα εκεί.
- Μετά από κάθε χρήση, ξεπλύνετε την κτένα επιμελώς με χλιαρό σαπουνόνερο, προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο εξάπλωσης της μόλυνσης.

Βήμα 1ο: εφαρμόστε το Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray



Ανακινήστε τη φιάλη πριν τη χρήση. Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray απευθείας σε στεγνά μαλλιά. Εφαρμόστε το Spray ομοιόμορφα σε στεγνά μαλλιά, από τις ρίζες μέχρι τις άκρες. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλα τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής. Κάντε καλό μασάζ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή του αυχένα και πίσω από τα αυτιά.
100ml = έως 4 εφαρμογές, αναλόγως του μήκους των μαλλιών.

Βήμα 2ο: αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά



Αφήστε το 5 λεπτά για τις φθείρες. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχής αντιμετώπιση των φθειρών και των κονιδιών, αφήστε το για 10 λεπτά.

Βήμα 3ο: λούστε τα μαλλιά



Απλώστε επαρκή ποσότητα σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά σε ολόκληρη την επιφάνεια των μαλλιών, χωρίς προηγουμένως να τα έχετε βρέξει και αφαιρέστε την αντιφθειρική λοσιόν. Εν συνεχεία, προσθέστε λίγο νερό και λούστε τα μαλλιά επιμελώς. Ξεπλύνετε τον αφρό. Επαναλάβετε το λούσιμο, μπορεί να χρειαστεί να λούσετε τα μαλλιά αρκετές φορές για να αφαιρέσετε τη λοσιόν από τα μαλλιά. Στη συνέχεια, ξεβγάλετε άφθονα. Είναι πιο εύκολο να ξεπλύνετε με ζεστό νερό (αποφύγετε τη χρήση κρύου νερού).

Βήμα 4ο: απομακρύνετε τις φθείρες & τα αυγά τους



Προτού στεγνώσετε τα μαλλιά, χρησιμοποιήστε την ειδικά σχεδιασμένη κτένα Paranix, που εσωκλείεται, για να απομακρύνετε τις φθείρες και τα αυγά τους. Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα μαλλιών.

- Χτενίστε τα μαλλιά ενώ είναι βρεγμένα με την ειδική κτένα.
- Χωρίστε τα μαλλιά σε 4 τμήματα, ακολουθώντας τη νοητή γραμμή από το μέτωπο έως τον αυχένα και ακολούθως από το ένα αυτί έως το άλλο. Εφόσον τα μαλλιά είναι μακριά, μπορείτε να πλέξετε τα μαλλιά που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα.
- Απομονώστε μικρές τούφες μαλλιών, έτσι ώστε να είναι εμφανές το δέρμα του τριχωτού.
- Χτενίστε κάθε τούφα μαλλιών, ξεκινώντας όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δέρμα. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα της αγωγής. Με προσεκτικό χτένισμα η αγωγή θα ολοκληρωθεί σωστά.
- Χρησιμοποιήστε την κτένα για να απομακρύνετε κάθε φθείρα ή/και τα αυγά που εντοπίζετε.
- Κάθε τούφα μαλλιών που δεν έχει αυγά, τοποθετήστε τη στην άκρη.
- Προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο μιας εκ νέου προσβολής από φθείρες, μετά από το χτένισμα της κάθε τούφας καθαρίζετε την κτένα με ένα βαμβάκι ενώ το χτένισμα πρέπει να γίνεται πάντα με φορά από την κορυφή του κεφαλιού προς τη βάση.

Σημαντική παρατήρηση

Οι φθείρες του τριχωτού της κεφαλής δεν μπορούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στο Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray, διότι ο τρόπος δράσης του είναι μη χημικός. Ωστόσο, είναι πιθανό ένα άτομο που έχει υποβληθεί σε αγωγή να προσβληθεί ξανά από φθείρες μέσω της επαφής με άτομα τα οποία δεν έχουν εφαρμόσει κάποια αγωγή (για παράδειγμα στο σχολείο). Χάρη στην τεχνολογία LPF, το Paranix Extra Strong Treats & Protects Spray μειώνει τις πιθανότητες επαναμόλυνσης μέχρι και 72 ώρες*. Ελέγξτε και πάλι τα μαλλιά ενώ είναι στεγνά, μετά από 7 ημέρες. Επαναλάβετε την αγωγή, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που να συνδέονται με την επανάληψη της αγωγής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Κόψη και γαλουχία:

Δεν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση του Paranix Extra Strong Treat & Protect Spray από γυναίκες που κωφορούν ή βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας. Ωστόσο, συστήνεται πάντα στις γυναίκες που κωφορούν ή βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας να συμβουλευθούν τον ιατρό ή το φαρμακοποιό τους πριν από τη χρήση οιοδήποτε σκευάσματος.

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για φθείρες του τριχωτού της κεφαλής (όχι ηβικές ή σωματικές φθείρες). Μην το χρησιμοποιείτε σε παιδιά κάτω των 12 μηνών.

Ποια άλλα μέτρα πρέπει να λάβετε;

Ενημερώστε το σχολείο και τον κοινωνικό σας περίγυρο για την προσβολή από φθείρες. Αποφύγετε την ανταλλαγή πιθανώς μολυσμένων ρούχων. Ελέγξτε όλα τα μέλη της οικογένειας για την παρουσία φθειρών και χρησιμοποιήστε το Paranix Extra Strong Treat & Protect Spray για την καταπολέμηση των φθειρών εάν είναι απαραίτητο.

Προφυλάξεις

Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με τα μάτια και τους βλεννογόνους (στόμα και μύτη). Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Εάν ο ερεθισμός των ματιών παραμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στα πετρελαιοειδή ή στο πολυισοβουτένιο. Σε περίπτωση εξανθήματος ή ερεθισμού / αλλεργίας, διακόψτε αμέσως την αγωγή. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν το τριχωτό της κεφαλής είναι ήδη ερεθισμένο ή τραυματισμένο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεπλύνει καλά το προϊόν. Μπορεί να χρειαστούν πολλά λουσιματα. Να σέβεστε πάντα τη διάρκεια της αγωγής. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό απόφραξη, π.χ. καλύπτοντας τα μαλλιά με καπέλο ή τυλιγμένο με σελοφάν.

Σε περίπτωση εξανθήματος / ερεθισμού ή υπερευαισθησίας σταματήστε αμέσως την αγωγή και λούστε τα μαλλιά σας με το κανονικό σας σαμπουάν. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης ή εισπνοής επικοινωνήστε με ιατρό ή το κέντρο κατά των δηλητηριάσεων. Σε περίπτωση που η μόλυνση επιμένει, συμβουλευτείτε ιατρό.

Εάν κατά λάθος σας πέσει το προϊόν, πλύνετε προσεκτικά το δάπεδο με σαπούνι και ζεστό νερό για να αποφύγετε τον κίνδυνο ολισθησης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ: Κρατήστε τα μαλλιά σας μακριά από φωτιά, φλόγες ή καυτά αντικείμενα (κεριά, τζάκι, στεγνωτήρα μαλλιών, σόμπα, ..). Μην καπνίζετε ποτέ κατά τη χρήση ή την αγωγή.

Κάθε σοβαρό συμβάν που έχει συμβεί σε σχέση με αυτό το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:

Μεσογείων 284,15562 Χολαργός
Τηλ.: 213 2040 000
e-mail: relation@eof.gr
Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας, 1475 Λευκωσία
Τηλ.+ 357 22608620
e-mail:phscentral@phs.moh.gov.cy

Πιθανές παρενέργειες

Κνησμός και ερεθισμός γύρω από τα μάτια. Σπάσιμο τριχών του τριχωτού της κεφαλής. Ερεθισμός και ερυθρότητα του τριχωτού της κεφαλής, των αυτιών ή του λαιμού.

Φύλαξη

- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος χωρίς υγρασία και φως, σε θερμοκρασία δωματίου.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά από την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη φιάλη.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

Απόρριψη

Κατά την απόρριψη της φιάλης, ξεπλύνετε και ανακυκλώστε σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες διαχείρισης αποβλήτων.

Composition

Mineral oil, Polyisobutene, Lice Protection Factor.

*Ο παράγοντας προστασίας LPF και η φθειροκτόνος δραστηριότητα αποδείχθηκαν με ex vivo δεδομένα. Χρησιμοποιήστε επαρκή ποσότητα προϊόντος και τη χτένα για να αφαιρέσετε όλα τα αυγά. Σε περίπτωση επαναμόλυνσης ή μη φυσιολογικής μόλυνσης, η αγωγή πρέπει να επαναληφθεί.

Omega Pharma International N.V.,
Venecoweg 26, B-9810 Nazareth, Belgium
www.paranix.gr

Διανομέας:
ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Αριστοτέλους 19-21, 144 51 Μεταμόρφωση,
Ελλάδα, Τηλ.: 2108188900
Διατίθεται στην Κύπρο από: C.A. Papaellinas Ltd,
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιάτη 179, 2235 Λατσία, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: 0035722741741

Τελευταία έκδοση: Σεπτέμβριος 2019

810002134 LF23854A

